

SUBSTANSNAMN:

Terbutalinsulfat

BEREDNINGSFORM:

Injektionsvätska

STYRKA:

0,5 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

Selektiv β_2 -receptorstimulerare

Dilaterar bronker

Relaxerar uterus

INDIKATIONER:

Bronkkonstriktion om patient ej orkar inhalera

Prematurt värkarbete (endast på särskild ordination)

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Intravenös injektion

Subkutan injektion

DOSERING:

Astma: 1 ml i.v./s.c.

**Prematurt värkarbete: 0,5 ml s.c. Ordineras av obstetiker/
barnmorska**

KONTRAINDIKATIONER:

Överkänslighet mot terbutalin.

FÖRSIKTIGHET:

Svår hjärt-kärlsjukdom

Okontrollerad hypertyreos

Hypokalemi

BIVERKNINGAR:

Huvudvärk

Takykardi

Tremor, kramp i händer och fötter

Rastlöshet, klåda, hudutslag

Vid prematurt värkarbete dessutom:

Hyperglykemi/hypokalemi

Lungödemsliknande sjukdomsbild

INTERAKTIONER:

Beta-blockerare kan helt eller delvis upphäva effekten av Bricanyl.