

SUBSTANSNAMN:

Amiodaronhydroclorid

BEREDNINGSFORM:

Injektionsvätska

STYRKA:

50 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

Förlänger aktionspotentialens längd både i förmak och kammare vilket innebär att repolarisationstiden förlängs (klass III effekt).

Har dessutom även antiarytmisk effekt av klass I,II och IV

Sinusfrekvensen minskar.

Minskar både supraventrikulära och ventrikulära arrytmier.

INDIKATIONER:

I samband med HLR

När ventrikelflimmer inte kan brytas med defibrillering

Vid mycket täta recidiv av kammarflimmer.

Förmaksflimmer

ADMINISTRATIONSSÄTT:

i.v. injektion

DOSERING:

Bolusdos 5 mg/kg. Vanligtvis ges 300 mg som snabb i.v. injektion i samband med HLR.

Spädes med Glucos 5% 20 ml.

OBS! Får ej blandas med NaCl pga risk för utfällning

I nödsituationer kan det ges utspätt om nålen spolats rikligt med NaCl efteråt, preparatet är dock mycket kärletande.

KONTRAINDIKATIONER:

Allergi mot Cordarone eller Jod

För övrigt inga kontraindikationer i samband med HLR enligt indikationer ovan

Vid övrig användning vg se FASS

BIVERKNINGAR:

Få biverkningar i samband med akutbehandling. Vid långtidsbehandling ses mängder med biverkningar v.g se FASS

INTERAKTIONER:

Inga av betydelse vid användning i HLR situationer.

ÖVERDOSERING:

Risk för totalblock och bradycardi