

Cyanokit

SUBSTANSNAMN:

Hydroxocobalamin (vit B₁₂)

BEREDNINGSFORM:

Pulver för beredning av injektionsvätska.

Blandas försiktigt, risk för skumbildning vid skakning.

STYRKA:

25mg/ml (5 g blandas i 200 ml)

Blandas i NaCl (kan även blandas i Ringer-Acetat eller Glukos 5 %)

TERAPEUTISK EFFEKT:

Binder cyanidjoner

INDIKATIONER:

Misstänkt cyanidförgiftning

- Exponering för brand i slutet utrymme.
- Sänkt medvetande.
- Sot kring andningsvägarna.

ADMINISTRATIONSSÄTT:

i.v. infusion under 15 minuter

Ges helst i egen infart på grund av interaktion med många andra läkemedel.

DOSERING:

Vuxna ges hela dosen på 5 g i.v.

Barn enligt tabell nedan.

Kroppsvikt (kg)	10	20	30	40	50	60
Volym (ml)	30	60	90	120	150	180

Dos kan upprepas 1 gång efter tidigast 15 min.

KONTRAINDIKATIONER:

Känd allergi

För övrigt inga kontraindikationer i samband med cyanidförgiftning

BIVERKNINGAR:

Se FASS, ej av intresse vid akut behov

INTERAKTIONER:

Omfattande, bör ges i egen i.v. infart. Påverkar laboratorieanalyser.