

SUBSTANSNAMN:

Lidocain/Prilocain

BEREDNINGSFORM:

Medicinskt plåster

STYRKA:

1 plåster innehåller: 25 mg Lidocain /25 mg Prilocain

TERAPEUTISK EFFEKT:

Lokalanestetikum

INDIKATIONER:

Ytanestesi inför kanylstick/provtagning

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Ett plåster appliceras på ett perifert kärl

**DOSERING:**

**Vuxna samt barn >10 kg:**

**1-2 plåster samtidigt, applikationstid max 1 timme**

**Barn 0-3 månader:**

**1 plåster, applikationstid max 1 timme**

KONTRAINDIKATIONER:

Prematura barn

Överkänslighet mot lokalanestetika

Känd methemoglobinemi

FÖRSIKTIGHET:

Icke intakt hud

BIVERKNINGAR:

Lokal blekhet, rodnad, ödem på applikationsstället

Klåda

Allergisk reaktion, anafylaktisk chock

Methemoglobinemi

INTERAKTIONER:

Samtidig behandling med sulfapreparat ökar risken för methemoglobinbildning

ÖVERDOSERING:

Mycket osannolik vid normal användning

Symtom:

Kramper, Andningsdepression, Arytmier, Blodtrycksfall