

**Orsak**

Hemophilus Influenzae (HIB)  
ÖLI

Bakteriell infektion

**Initial bedömning**

ABCDE

Potentiellt livshotande!

**Riktad anamnes**

**S** Tilltagande sväljsvårighet, grötigt tal, feber, halsont, inspiratorisk stridor, dregling, vägrar ligga ner.

- O** Halsont med successiv utveckling av andningsbesvär
- P** Vill sitta upprätt, framåtlutad
- Q** Svullnad i hals försvårar tal, sväljning och andning
- R** Lokaliserat till halsen
- S** Livshotande
- T** Akut tilltagande besvär

- A** Överkänslighet/allergi?
- M** Vaccination mot HIB?
- P**
- L** Inkluderar nappflaska/amning
- E**

**Undersökning**

<b>Vital-parametrar /status</b>	Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)
<b>Riktad</b>	Visuell inspektion av svalg (peta ej i svalget - risk för laryngospasm) Inspiratorisk stridor?

## Behandling

**Basal** (fri luftväg, assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”).  
 Prioritera avtransport, skapa lugn miljö, undvik smärtsamma eller orosskapande åtgärder

## Specifik

- Inhalation **adrenalin** 1 mg/ml:

Vikt (kg)	5	10	15	20	25	30	≥40
Volym (ml)	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0
Späd med NaCl till 2 ml							

- Snabb avtransport.
- Transportera sittande på bår.
- Vid allvarligt tillstånd: venväg om möjligt, alternativt **EMLA**<sup>®</sup> barn (3 mån–1 år) 1 st plåster. Barn (>1år) 2 st plåster.
- Förvarna mottagande sjukhus.
- Förvarna/tillkalla högre medicinsk kompetens i tidigt skede.

## Övervakning

- Basal (ABCD, vitalparametrar/-status).
- EKG-övervakning.

## Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling (barn <18 år)”