

Orsak

Bakteriell infektion

Haemophilus Influenzae

ÖLI

Initial bedömning

ABCDE

Sällan livshotande hos vuxna

Riktad anamnes

S Viros, ÖLI, halsont

<p>O Tilltagande sväljsvårighet, grötigt tal, feber, halsont, inspiratorisk stridor, dregling</p> <p>P Vill sitta upprätt, framåtlutad</p> <p>Q Svullnad i hals försvårar tal, sväljning och andning</p> <p>R Lokaliserat till halsen</p> <p>S Bedöm grad av luftvägspåverkan</p> <p>T</p>
--

<p>A</p> <p>M</p> <p>P</p> <p>L</p> <p>E</p>

Undersökning

Vital-parametrar /status	Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)
Riktad	Visuell inspektion av svalg. Stoppa aldrig något i patientens mun – risk för laryngospasm!

Indikationer för behandling

Misstanke om epiglottit

Behandling

Basal (fri luftväg, assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling”).

Specifik

- Inhalation **adrenalin** 1 mg/ml, 2 ml, kan upprepas
- Inj. **betametason** 4 mg/ml, 1 ml i.v.
- Transportera sittande på bår.

Övervakning

- Basal (ABCD, vitalparametrar/-status)
- EKG-övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”

Snabb transport till sjukhus, förvarna i god tid.