

SUBSTANSNAMN:

Furosemid

BEREDNINGSFORM:

Injektionsvätska

STYRKA:

10 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

Snabb dilatation av venösa kapacitanskärl, som leder till sänkning av fyllnadstrycket i vänster kammare.

Kraftig diuretisk effekt efter cirka 10 minuter med en påföljande, vanligen svag blodtryckssänkande effekt. effekten sitter i 1½-3 tim

Patienter som sedan tidigare behandlas med loopdiuretika (Furix®, Furosemid, Lasix®, Impugan®) har ofta nedsatt effekt av en given dos.

INDIKATIONER:

Lungödem

Grav, akut hjärtsvikt

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Långsam intravenös injektion

DOSERING:

Vuxen: 2-4 ml, dosen kan upprepas till högst 8 ml.

KONTRAINDIKATIONER:

Hypotension (systoliskt blodtryck < 90 mmHg)

Hypovolemi

Leverkoma

Hypokalemi

FÖRSIKTIGHET:

Cirkulationssvikt

Graviditet

Prostataförstoring (tömningshinder)

BIVERKNINGAR:

Hypovolemi

Elektrolytstörningar (främst hypokalemi, hyponatremi, hypokalcemi).

Urinretention

Hörselpåverkan

ÖVERDOSERING:

Symtom:

Polyuri, törst och dehydrering, hypovolemi, blodtrycksfall

Takykardi, arytmier, Förvirring, yrsel, ev. koma, Muskulär svaghet, parestesier