

Glasgow Coma Scale (GCS)

Glasgow Coma Scale baseras på tre undersökningar

- ögonöppning
- verbalt svar
- motoriskt svar

GCS är en allmänt accepterad metod för att följa förändringar i medvetandegraden hos en traumapatient.

GCS anges som summan av poängen från de tre deltesterna

Ögonöppning	4	Spontant
	3	På uppmaning
	2	På smärtstimuli
	1	Ingen reaktion
Verbalt svar (bästa svar)	5	Orienterad
	4	Desorienterad, förvirrad
	3	Talar osammanhängande men begripliga ord
	2	Oförståeliga ord, grymtar
	1	Ingen reaktion
Motoriskt svar (bästa svar)	6	Lyder uppmaning
	5	Lokaliserar smärta
	4	Undandragande rörelse vid smärtstimulering
	3	Stereotyp böjrörelse vid smärtstimulering
	2	Stereotyp sträckrörelse vid smärtstimulering
	1	Ingen reaktion

- Väck sovande patient. Bestäm först om patienten är kontaktbar eller inte.
- Börja undersökningen med så litet våld som möjligt, d.v.s. tala/ropa till patienten.
- Smärtstimulering görs med knogarna mot bröstbenet och observera armarna. Vid misstanke om hög spinal skada kan smärtstimulering ske i käkvinklar eller ögonbryn.
- Bästa svaret (= högsta nivån) av respektive undersökning skall noteras.
- Upprepa undersökningarna om patienten varierar i medvetandegrad.