

Hjärtstopp	barn
------------	------

Orsak

Medfödd hjärtsjukdom	Övertryckspneumothorax
Hypoxi/anoxi (ex drunkning, luftvägshinder)	Hypotermi
	Elektrolytrubbning
Hypovolemi	Förgiftning

Initial bedömning

A B C D E

Konstatera hjärtstopp - Undvik fördröjning av HLR

Riktad anamnes

S Medvetslös, ingen eller agonal andning.
--

O Hur? Vad föregick hjärtstoppet? Bevittnat? HLR påbörjad?
P
Q
R
S
T Så exakt som möjligt

A
M
P Känd hjärt-/kärlsjukdom? Aktuell svår sjukdom?
L
E Förgiftning? Trauma? Hypotermi?

Undersökning

Vital-parametrar/status	Fri luftväg. Andningsstopp, agonal andning. Tecken till upphävd cirkulation (dålig tonus/slapp, gråblek hudfärg, reagerar ej på tilltal, försiktiga skakningar).
Riktad	EKG – om möjligt (VF, VT, annan rytm)

Behandling

Basal

- Fri luftväg
- Gör omedelbart 5 inblåsningar med oxygen
- Hjärtkompressioner
 - o Kompressionsdjup minst 4-5 cm
 - o Takt 100–120/min
 - o Kompression-ventilationsförhållande 15:2
- Fortsatt återupplivning in till sjukhus.
- Behandla enligt A-HLR-schema barn – se nästa sida

Mål för behandling

Återupprättad cirkulation.

Övervakning

Luftväg	skall hållas helt fri
Andning	andningsmönster, frekvens, saturation,
Cirkulation	puls, blodtryck, perifer cirkulation (kapillär återfyllnad)
Medvetande	vakenhetsgrad GCS

Behåll defibrillatorn uppkopplad