

Behandling

Basal (fri luftväg, assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling”).

- Alltid **oxygen**, 10-15 liter på reservoarmask oavsett saturation!

Specifik**1. Vid hosta/luftvägssymtom:**

- Inhalation **salbutamol** 2 mg/ml:

Kroppsvikt (kg)	5	10	15	20	25	≥30
Volym (ml)	0,4	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5
	Späd med NaCl till 2 ml					

Kan upprepas efter 15 min.

Ge därefter:

- Inhalation **budesonid** Turbuhaler 400 µg/dos. Efter varje dos hålls andan i 10 sek, några normala andetag och därefter en ny dos.
Ge sammanlagt 5 doser.

2. Vid cirkulation- eller medvetandepåverkan, där misstanke om brandrök/cyanid finns:

- Inf. **hydroxokobalamin** 25 mg/ml i.v. ca 3 ml/kg, ges under 15 min:
Rekvireras från AKM eller ambHKP

Kroppsvikt (kg)	10	20	30	40	50	60
Volym (ml)	30	60	90	120	150	180

Övervakning

- Basal (ABCD, vitalparametrar/-status).
- EKG-övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling (barn <18 år)”