

Orsak

Läkemedel	Droger	Gaser
Lösningsmedel	Alkoholer	Växter
Hushållskemikalier		Svampar

Initial bedömning

A B C D E

Riktad anamnes

S Påverkan av vitala funktioner i varierande grad. T.ex. andningsbesvär, cirkulationspåverkan, medvetandepåverkan, kramper, hudskador, Illamående/kräkningar, buksmärta, arytmier, m.m. Tag rätt på förpackningar!

O Urakut till långsamt insättande symtom. Misstänkt orsak/ämne?
Förtärts/injicerats/inandats? Mängd?
P
Q
R
S Obetydliga till uttalade besvär
T När och var inträffade intoxikationen och hur har symtomen utvecklats

A
M Psykofarmaka, analgetika?
P Känt missbruk, psykiatrisk sjukdom
L Har patienten kräkts? (tablettrester etc.)
E Vad föregick intoxikationen? Exposition i slutet utrymme?

Undersökning

Vital-parametrar/ status	Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp) P-glukos? Tänk på egen säkerhet! Tänk på att pulsoximeter kan ge falskt höga värden vid CO och cyanidförgiftning!
Riktad	Inspektion av hud och slemhinnor. Stickmärken? 12-avl EKG vid intoxikation av hjärtfarmaka.

Behandling

Basal (fri luftväg, assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”).

Specifik**Vaken patient:**

- som ej intagit frätande ämnen eller petroleumprodukter, ge kolsuspension 150 mg/ml, 70 ml p.o.
- helt vaken patient, som intagit frätande ämnen eller petroleumprodukter, ge snarast gärna fetthaltig dryck 1-2 msk (mjölk/grädde/matolja). Framkalla ej kräkning.

Medvetandesänkt eller medvetlös patient:

- brandrök: ge oxygen i hög koncentration
- vid symtomgivande brandröksförgiftning, ge inj. **hydroxokobalamin** 25 mg/ml i.v. ca 3 ml/kg.
Rekvireras från AKM eller AmbHKP.

Vikt i kg	5	10	15	20	25	30	40	50
Dos i ml	15	30	45	60	75	90	120	150

- misstanke om opioidförgiftning ge naloxon 0,4 mg/ml i.v., alternativt intranasalt

Vikt (kg)	5	10	15	20	25	30	≥40
Volym (ml)	0,1	0,25	0,35	0,5	0,6	0,75	1

kan upprepas 1 gång

- vid symtomgivande bradykardi ge atropin 0,5 mg/ml, i.v.

Vikt (kg)	5	10	15	20	≥25
Volym (ml)	0,2	0,4	0,6	0,8	1

kan upprepas 1 gång

- bedöm behov av vätska, ge ev. Ringer-acetat, i.v.

Vikt (kg)	5	10	15	20	25	30	40	50
Volym (ml)	50	100	150	200	250	300	400	500

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, barn”

Övervakning

Basal (ABCD, vitalparametrar/-status)

Överväg EKG-övervakning