

Ketanest

SUBSTANSNAMN:

Esketamin

BEREDNINGSFORM:

Injektionsvätska

STYRKA:

25 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

Analgetisk effekt inom 1-2 minuter vid intravenös injektion, som kvarstår i 5-15 minuter.

Stimulerar cirkulation och andning, är bronkdilaterande.

Normalt påverkas inte på reflexerna i farynx/ larynx och muskeltonus förblir vanligen normal eller något ökad.

Salivproduktionen ökar

Obs! Effekten av preparatet kan vara svårvärderad, patienten kan se opåverkad ut, bedöm i första hand effekten efter svaret på smärtstimuli.

INDIKATIONER:

Svåra smärttillstånd vid trauma.

ADMINISTRATIONSSÄTT:

I första hand intravenös injektion eller nasal tillförsel.

I undantagsfall intramuskulärt. Har även effekt vid oral tillförsel

DOSERING:

För i.v. bruk spädes stamlösningen 1:5

Tag 2 ml Ketanest 25 mg/ml + 8 ml NaCl

vilket ger styrkan 5 mg/ml. Dosering i.v. 0,125 mg/kg.

Till vuxen rekommenderas en startdos på 5-10 mg (1-2 ml) iv.

Upprepad dosering efter kliniskt svar.

Samtidig tillförsel av midazolam 5 mg/ml (0,25-0,5 ml i.v.)

rekommenderas för att minska risken för obehagliga drömmar/snedtändning

För nasal tillförsel används stamlösning Ketanest 25 mg/ml

Tillföres via MAD i upprepade 0,25 ml doser

Dosering 0,5-(1 mg)/kg

KONTRAIKATIONER:

Patienter hos vilka en höjning av blodtrycket utgör en allvarlig risk.

Eklampsi och pre-eklampsi

FÖRSIKTIGHET:

Hjärtinkompensation och obehandlad hypertoni.

Sjukdom i CNS med risk för intrakraniell tryckstegring.

Akut eller kronisk alkoholförgiftning.

BIVERKNINGAR:

Toniska och kloniska rörelser

Ökad sekretion i luftvägarna

INTERAKTIONER:

midazolam/opioider/lustgas förstärker effekten av ketamin