

**Orsak**

Magsår	Tumör	Trauma
Esofagusvaricer	Näsblödning	Kirurgi
Inflammatorisk tarmsjukdom	Kärlmissbildning	Hemorrhoider

**Initial bedömning**

ABCDE

**Riktad anamnes**

<b>S</b> Illamående, Kräkning, Avföring, Nedsatt ork, Svimning,
---

- |  |
|--|
| <p><b>O</b> Plötsligt, smygande</p> <p><b>P</b> Förvärras eller lindras besvären av något (matintag, läkemedel, kroppsläge),</p> <p><b>Q</b> Frekvens, färg, utseende på kräkning/avföring</p> <p><b>R</b></p> <p><b>S</b> Volym. Frekvens</p> <p><b>T</b></p> |
|--|

- |  |
|--|
| <p><b>A</b></p> <p><b>M</b> Antikoagulantia, antibiotika, förändrad medicinering, naturläkemedel,</p> <p><b>P</b> Tidigare GI-blödning, missbruk, leversjukdom, anemi,</p> <p><b>L</b> Intag av föda och dryck, elimination</p> <p><b>E</b> Fler sjuka i omgivningen, utlandsresa, nyligen opererad mun/svalg/GI</p> |
|--|

**Undersökning**

<b>Vital-parametrar /status</b>	Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)
<b>Riktad</b>	Generell eller lokaliserad smärta. EKG-övervakning

**Behandling**

**Basal** (fri luftväg, assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt ”Prehospital undersökning och behandling”).

**Specifik**

- Vid hypotension och påverkad patient koppla infusion **Ringer-acetat** (max 2000 ml i.v.)
- Vid smärta – inj **morfin** 1 mg/ml, 2,5 ml i.v. upprepas till max 20 ml.
- Vid illamående Inj **ondansetron** 2 mg/ml, 2 ml i.v.

**Övervakning**

- Basal (ABCD, vitalparametrar/-status)

**Mål för behandling**

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”.