

Naloxonhydroklorid

SUBSTANSNAMN:

Naloxonhydroklorid

BEREDNINGSFORM:

Injektionsvätska

STYRKA:

0,4 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

Specifik antidot (antagonist) mot substanser med morfinliknande verkan (opioider).

Naloxonhydroklorid motverkar snabbt agonisters och partiella agonisters effekter, inklusive de analgetiska.

Effekten kommer vanligen inom 2 minuter efter intravenös injektion, efter intramuskulär eller subkutan injektion något senare.

Effektdurationen är beroende av dosen och administrations sättet.

INDIKATIONER:

Överdoser, särskilt med andningsdepression, orsakad av samtliga analgetika av morfintyp (opioider).

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Långsam intravenös injektion.

Kan administreras intramuskulärt eller subkutan, men effekten sätter då in långsammare.

DOSERING:

Opioidöverdos, känd eller misstänkt;

Vuxen: 1ml som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutan), om önskad förbättring av andningsfunktionen inte inträder omedelbart ges ytterligare 1-2 injektioner med 2-3 minuters mellanrum.

Vid önskemål om noggrannare dositering. Späd 1 ml

Naloxonhydroklorid med 9 ml NaCl. Ge 1 ml av denna blandning (Naloxonhydroklorid 40 µg/ml) iv i taget till dess önskad effekt uppnåtts.

Barn: 0,01 mg/kg som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutan). Denna dos kan upprepas som hos vuxen.

”Missbrukare”: överväg en dos om 1 ml subkutan omedelbart före den intravenösa dosen ifall de ”rymmer” när de vaknar. Hos denna grupp kan det vara klokt att försiktigt titrera dosen med den spädda lösningen

KONTRAINDIKATIONER:

Överkänslighet mot Naloxonhydroklorid

FÖRSIKTIGHET:

Naloxonhydroklorid är inte effektivt mot andningsdepression orsakad av andra medel än opioider.

Kan utlösa abstinenssymtom hos missbrukare av opioider.

BIVERKNINGAR:

Illamående, kräkningar, svettningar

Lungödem

Takykardi, tremor

Återkommande andningsdepression på grund av att Naloxonhydroklorid har kortare halveringstid än de flesta opioider.

INTERAKTIONER:

Inga som hindrar behandling.