

Rapifen

SUBSTANSNAMN:	Alfentanilhydroclorid
BEREDNINGSFORM:	Injektionsvätska
STYRKA:	Stamlösning 0,5 mg/ml, kan spädas innan administration (2 ml Rapifen 0,5 mg/ml + 8 ml Nacl) till slutlig koncentration 0,1 mg/ml eller ges outspätt
TERAPEUTISK EFFEKT:	Kraftig analgetisk effekt inom 1-2 minuter som varar ca 30 min
INDIKATIONER:	Svår smärta oberoende av genes (främst dock vid procedurrelaterad smärta i samband med frakturer, luxationer och överflyttning)
ADMINISTRATIONSSÄTT:	Intravenös injektion.
DOSERING:	Doseras individuellt utifrån patientens kroppsvikt, ålder, smärtans svårighetsgrad, samt reaktion på initial dos. Vuxen: 0,25 mg intravenöst i upprepade doser med några minuters mellanrum till önskad effekt. Max 2 mg. Till äldre bör ännu lägre doser ges initialt. Barn: 5 microgram/kg intravenöst. Kan upprepas efter några minuter. Vid kombination med Morfin ges Morfinet i låg dos <u>efter</u> titrering av Rapifendos

Startdos

Vikt (kg)	5	10	15	20	25	30	40	50
ml Rapifen (0,1 mg/ml)	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5

FÖRSIKTIGHET:	Äldre patienter Drog och alkoholpåverkan Skallskada Astma/ KOL
BIVERKNINGAR:	Yrsel Andningsdepression Bradykardi Blodtrycksfall, framför vid hypovolemi Illamående, kräkningar
ÖVERDOSERING:	Blodtrycksfall, andningsdepression
ANTIDOT:	Naloxonhydroklorid