

Reaktionsskala (RLS 85)

Vaken. Normal reaktion på tilltal. Orienterad	1
Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt smärtstimulering. Tilltal, enstaka tillrop, beröring.	2
Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering. (upprepade tillrop, ruskning, smärtstimulering).	3
Medvetlös. Lokaliserar men avvärjer ej smärta.	4
Medvetlös. Undandragande rörelse vid smärta.	5
Medvetlös. Stereotyp böjrörelse vid smärta.	6
Medvetlös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta.	7
Medvetlös. Ingen smärtreaktion.	8

RLS 85

- Väck sovande patient. Bestäm först om patienten är kontaktbar eller inte.
- Smärtstimulering görs på båda sidor, först i käkvinkeln eller ovanför ögonbrynen sedan mot nagelbädden.
- Bästa svaret (= högsta nivån) skall noteras t ex patient som både böjer och sträcker hör till nivå 6 (= ”böjare”).
- Orientering prövas ej på intuberad eller afatisk patient.
- Patienten är oklar om han svarar fel på någon av frågorna namn (för- och efternamn), plats (t ex stadens namn eller ”på sjukhus”) eller tid (år och månad).

Förklaring av rörelsesvaren:

- Avvärjer (nivå 3) smärta, finner och försöker föra bort stimuleringen.
- Lokaliserar (nivå 4), försöker finna stimuleringen, men avvärjer ej.
- Undandragande rörelse (nivå 5), drar sig från stimuleringen.