

## Spasmofen

### SUBSTANSNAMN:

Morfin(hydroklorid), Methylscopolamin, Papaverin, Noscapin, Codein  
(Motsvarar ett totalextrakt av opium + papaverin + methylscopolamin)

### BEREDNINGSFORM:

Injektionsvätska

### STYRKA:

(Se FASS beträffande ingående substanser)

### TERAPEUTISK EFFEKT:

Kraftig analgetisk effekt inom 10 minuter, vid intravenös administrering, som varar 3 - 5 timmar.

Löser krampstillstånd i glatt muskulatur

### INDIKATIONER:

Svår smärta vid spastiska krampstillstånd i glatt muskulatur särskilt i gall och urinvägar samt mag-tarm kanalen

### ADMINISTRATIONSSÄTT:

Långsam intravenös injektion.

I undantagsfall intramuskulärt eller subcutant.

### DOSERING:

**Doseras efter samråd med kirurg på mottagande sjukhus**

**Vuxen: 1ml långsamt iv (kan ev. upprepas)**

**Barn:Ej aktuellt**

### KONTRAINDIKATIONER:

Andningsdepression

Sekretstagnation

Signifikant hypotension

Orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan.

### FÖRSIKTIGHET:

Misstänkt hypovolemi.

Odiagnostiserade buksmärtor.

Bronkialastma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Skallskada med intrakraniell tryckstegring.

Thoraxskador

Äldre patienter

Narkomani

Glaucom

Omedelbart förestående förlossning

## BIVERKNINGAR:

Morfinliknande biverkningar som:

- Andningsdepression
- Sedering
- Gallväggsspasm
- Bradykardi, behandlas med atropin.
- Blodtrycksfall, framför vid hypovolemi
- Bronkkonstriktion
- Illamående, kräkningar, obstipation
- Yrsel
- Urinretention
- Klåda

Metylscolaminbiverkningar som:

- Dåsighet
- Muntorrhet
- Hjärtarytmi
- Urinretention
- Ackomodationsstörningar
- Förvirring, hallucinationer

## INTERAKTIONER:

Effekten förstärks vid samtidig administrering av lustgas, samt andra läkemedel med sederande effekt.

## ÖVERDOSERING:

- Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation, hallucinos.
- Uttalad andningsdepression
- Pupillpåverkan, muntorrhet
- Blek, fuktig hud

Behandling av överdosering:  
se naloxonhydroclorid