

SUBSTANSNAMN:

Diazepam

BEREDNINGSFORM:

Injektionsvätska

STYRKA:

5 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

Kramplösande

Lugnande/ sederande

Ångstdämpande

En mycket snabb övergång till CNS ger en så gott som omedelbar effekt.

INDIKATIONER:

Pågående kramper

Akuta ångest- och orostillstånd

Kombinationsbehandling med ketamin

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Långsam intravenös injektion

DOSERING:

Kramper – Vuxna: 2 ml, kan upprepas om kramperna inte upphör eller återkommer till max. 6 ml.

Kramper – Barn:

5-12 kg 1 ml

>12 kg 2 ml

Barn > 40 kg: dosen kan upprepas 1 gång om kramperna ej upphör eller återkommer.

Ångstdämpande – Vuxna: 0,25 ml, kan upprepas, en gång.

Som tillägg till ketamin ge ½-1 ml iv.

OBS! Äldre (över 70 år) uppvisar högre känslighet, varför dosen bör hållas nere.

KONTRAIKATIONER:

Inga kliniskt relevanta vid pågående kramper.

Sömnapné syndrom

FÖRSIKTIGHET:

Äldre

Svår lever- eller njursjukdom

Alkoholpåverkan

Respiratorisk insufficiens

Missbrukare

Myastenia gravis

Kraftigt nedsatt allmäntillstånd

BIVERKNINGAR:

- Yrsel, förvirring
- Smärta på injektionsstället
- Amnesi
- Cirkulationssvikt
- Andningsdepression

INTERAKTIONER:

Vid samtidig behandling med Teofyllin minskar effekten av Stesolid® Novum.
Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av Stesolid® Novum kraftigt.
Vid samtidig behandling med morfinanalgetika ökar den andningsdepressiva effekten.

ÖVERDOSERING:

- Agitation/aggressivitet, hallucinationer
- Muskelsvaghet
- Somnolens – medvetslöshet
- Andningsdepression
- Blodtrycksfall

Symtomatisk behandling vid ev. blodtrycksfall och/eller andningsdepression.