

SUBSTANSNAMN:

Diazepam

BEREDNINGSFORM:

Klysma

STYRKA:

5 mg (klysma 2,5 ml = 2 mg/ml)

TERAPEUTISK EFFEKT:

Kramplösande

Lugnande/ sederande

Ångestdämpande

Muskelavslappnande

100% biotillgänglighet med maximal plasmakoncentration inom 10-15 minuter.

INDIKATIONER:

Pågående kramper och avsaknad av intravenös infart.

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Införes rektalt

**DOSERING:**

**Kramper – Vuxna: 2 klysma, kan upprepas om kramperna ej upphör eller återkommer.**

**Kramper – Barn:**

**5-12 kg    1 klysma**

**>12 kg    2 klysma**

**Barn > 40 kg: dosen kan upprepas 1 gång om kramperna ej upphör eller återkommer.**

**OBS! Äldre (över 70 år) uppvisar högre känslighet, varför dosen bör hållas nere till 1 klysma.**

KONTRAINDIKATIONER:

Inga kliniskt relevanta vid pågående kramper.

FÖRSIKTIGHET:

Äldre

Svår lever- eller njursjukdom

Alkoholpåverkan

Respiratorisk insufficiens

Missbrukare

Myastenia gravis

Kraftigt nedsatt allmäntillstånd

BIVERKNINGAR:

Yrsel, förvirring

Smärta på injektionsstället

Amnesi

Cirkulationssvikt

## Andningsdepression

### INTERAKTIONER:

Vid samtidig behandling med Teofyllin minskar effekten av Stesolid® Novum.

Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av Stesolid® Novum kraftigt.  
Vid samtidig behandling med morfinanalgetika ökar den andningsdepressiva effekten.

### ÖVERDOSERING:

Agitation/aggressivitet, hallucinationer

Muskelsvaghet

Somnolens – medvetlöshet

Andningsdepression

Blodtrycksfall