

SUBSTANSNAMN:

Glyceryltrinitrat

BEREDNINGSFORM:

Buckaltablett

STYRKA:

2,5 mg/dos

TERAPEUTISK EFFEKT:

Lågdos ger vendilatation och minskat venöst återflöde = minskad preload.

Högdos ger arteriell dilatation och reducerat kärlmotstånd = minskad afterload.

Snabb verkan (inom 1-2 min.) med effekt 20-30 minuter.

INDIKATIONER:

Anfallskupering vid angina pectoris. Behov av kontinuerlig effekt

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Placeras buckalt (mellan överläpp och tandkött)

DOSERING:

Initialt 1 tablett. Dosen kan succesivt höjas med en tablett var 15:e minut till maximalt 4 tabletter om blodtrycket kvarstår över 100 mmHg systoliskt

Tabletten är verksamt så länge den sitter på plats, dock max i ca 4 timmar

Tabletten får ej delas

KONTRAINDIKATIONER:

Akut cirkulationssvikt

Allvarlig hypotension (systoliskt blodtryck < 80 mmHg)

Medicinering mot erektil dysfunktion senaste dygnet

Kardiogen chock

Pulmonell hypertension

Perikardiell tamponad

FÖRSIKTIGHET:

Hypotension (inkl. ortostatisk hypotension)

Cerebrovaskulär sjukdom

Förhöjt intrakraniellt tryck

Akut hjärtinfarkt

Aortastenosis, mitralisstenosis

Annat hjärtmuskelsjukdom

Hypoxemi

BIVERKNINGAR:

Huvudvärk, yrsel, Hypotension, Ökad hjärtfrekvens, Flush

Illamående, Svimning

INTERAKTIONER:

Medel mot erektil dysfunktion – samtidig behandling kan leda till kraftigt blodtrycksfall, hjärtischemi och cerebral cirkulationsstörning.