

Tavegyl

SUBSTANSNAMN:

klemastin

BEREDNINGSFORM:

Tabletter, mixtur, inj vätska

STYRKA:

Tabletter à 1 mg, Mixtur 50 µg/ml, Inj vätska 1 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT:

Antihistamin (H1-antagonist)

INDIKATIONER:

Allergiska tillstånd.

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Tabletter och mixtur po.

Inj.vätska: Intravenös tillförsel

DOSERING

Vuxna

1 tabl vb. (Max dygnsdos 6 tabl)

Inj 1-2 ml långsamt iv (2-3 min).

Barn 0,05 mg/kg och dag fördelat på 2 doser

- Mixt. klemastin 50 µg/ml p.o (0,05 mg/kg):

Ålder (år)	0-1	1-6	6-12
Dos (mg)	0,25	0,5	1
Volym (ml)	5	10	20
			alt T. klemastin 1 mg, 1 st

- Inj. klemastin 1 mg/ml. i.v alt. i.m, 0,05 ml/kg:

Kroppsvikt (kg)	5	10	15	20	25	30	40
Volym (ml)	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2

KONTRAINDIKATIONER:

Överkänslighet

FÖRSIKTIGHET:

Prostahyperplasi, myastenia gravis, alkohol eller drogpåverkan

BIVERKNINGAR:

Trötthet, muntorrhet, excitation (barn)