

SUBSTANSNAMN:

Acetylsalicylsyra

BEREDNINGSFORM:

Tablett

STYRKA:

75 mg

TERAPEUTISK EFFEKT:

Hämmar trombocytaggregationen

INDIKATIONER:

Centrala bröstsmärtor med misstanke på akut hjärtinfarkt – om patienten tål ASA.

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Per os

DOSERING:

4 tabletter

KONTRAINDIKATIONER:

intag av Allvarliga allergiska symtom, anafylaxi, eller generell urticaria vid tidigare acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat.
Astmasymtom, vid tidigare intag av acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat.
Aktivt ulcus i magsäck och/eller tarm.
Trombocytopeni
Levercirrhos
Känd blödarsjuka

FÖRSIKTIGHET:

Lever- och njurskador
Waranbehandling eller annan antikoagulantibehandling.
Graviditet: kan påverka trombocytfunktionen hos fostret.

BIVERKNINGAR:

Magsmärtor, halsbränna
Illamående
Ökad blödningsbenägenhet
Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit, astma)

INTERAKTIONER:

Samtidig behandling med Waran® ger ökad risk för blödningar.