

Ventoline

SUBSTANSNAMN:

Salbutamol

BEREDNINGSFORM:

Inhalationsvätska

STYRKA:

2 mg/ml (endosbehållare 2,5 ml = 5 mg).

TERAPEUTISK EFFEKT:

Selektiv β_2 -receptorstimulerare

Dilaterar bronker

Effekt inom ett par minuter efter inhalation, max. efter 30-60 minuter och kvarstår som regel minst 4 timmar.

INDIKATIONER:

Akut obstruktiv lungsjukdom

ADMINISTRATIONSSÄTT:

Inhalation via nebulisator.

DOSERING:

Vuxen: Inhalation Ventoline® 2 mg/ml, 1-2 endosbehållare á 2,5 ml.

Barn: Inh. Ventoline 2mg/ml (0,15 mg/kg)

Kroppsvikt (kg)	5	10	15	20	25	30	40	50
Ventoline® 2 mg/ml	0,4 ml	0,75 ml	1 ml	1,5 ml	2 ml	2,25 ml	2,5 ml	2,5 ml

Späd vb med NaCl upp till 2 ml

(Barn < 1 år svarar ofta dåligt på inhalationsbehandling).

KONTRAINDIKATIONER:

Överkänslighet mot salbutamol.

FÖRSIKTIGHET:

Svår hjärt-kärlsjukdom

Okontrollerad hypertyreos

Hypokalemi

BIVERKNINGAR:

Takykardi, palpitationer

Tremor, yrsel

Huvudvärk

Bronkospasm

ÖVERDOSERING:

Huvudvärk, illamående, kräkning

Irritabilitet, upprymdhet, somnolens

Motorisk oro, tremor, ev. kramper

Takykardi, palpitationer, arytmier

Blodtrycksstegring eller -fall

Hyperglykemi