



## ANELÄK Bridiondosering

Vid brist på neostigmin eller behov av snabbare effekt använder vi Bridion för att reversera Esmeron / rocuronium. I FASS finns doseringsrekommendationer för de djupare blockaderna. Efter att ha läst en studie om reversering av ytligare blockering med lägre doser upprättas följande riktlinjer:

**För omedelbar reversering av intubationsdos rocuronium :16 mg/kg**

**Vid djup blockad - PTC 2: 4 mg/kg**

**Vid TOF  $\geq$  2 ( 2-3 ryckningar): 2 mg/kg**

**Vid TOF  $\geq$  4 (4 ryckningar, <50%): 1 mg/kg**

**Vid TOF  $\geq$  50 % 0,5 mg/kg**

**Dosering efter total kroppsvikt.**

**Effekt inom 5 min på nästan alla patienter – monitorera tills TOF > 90% !**

**Hantering (vid behov av spädning, dos < 200mg):**

- En ampull Bridion 100 mg/ml, 2 ml = 200 mg spädes med 18 ml koksalt i en 20 ml-spruta = 10 mg / ml . Märk sprutan.
- Dra upp den tilltänkta dosen i ny spruta.
- Spara resten i kylskåpet. Hållbart i 24 timmar.
- Blandas i medicinrummet, kolla först om det finns kvar färdigspädd.

Referens:

Sugammadex and Neostigmine Dose-finding Study for

Reversal of Shallow Residual Neuromuscular Block

Stefan J. Schaller, Anesthesiology 2010; 113:1054 – 60