



ANELÄK Riktlinjer för användande av syrgas och pulsoxymeter vid transport av postoperativa patienter till UVA/IVA.

Alla patienter som har varit sövda skall övervakas med pulsoxymeter vid transport till UVA / IVA.

Alla patienter som blivit opererade i regionalanestesi och peroperativt haft problem med syresättningen skall övervakas med pulsoxymeter vid transport till UVA / IVA.

Patienter med risk för postoperativ andningspåverkan, t.ex. adipösa patienter, de som genomgått stora laparotomier, traumafall och neonatala barn skall ha syrgastillförsel vid transport till UVA / IVA.

Patienter som peroperativt krävt åtgärder för förbättrad syresättning, t.ex. rekrytering, ändrade ventilatorinställningar eller ökad syrgastillförsel skall ha syrgastillförsel under transport till UVA / IVA.

Om man beslutar att inte använda syrgas och/eller pulsoxymeter under transport från operationssal ska detta noteras i anestesijournalen: "Patienten behöver ingen syrgas/pulsoxymeter under transport". Beslut kan tas av patientansvarig anestesijuksköterska.

Den salsbundna mobila pulsoximetern förvaras i fack/låda i anesthesiapparatens. Portabel syrgasutrustning finns på pelare i allén.

Portabel syrgas ska finnas med vid transport från utgård sövning då också pulsoxymeter ska användas.