



ANELÄK NSAID-preparat för vuxna

Kontraindikationer för alla preparat är:

Svår hjärtsvikt
Svår njursvikt
Svår leversvikt

ASA-allergi
Hypovolemi
Aktiv ulcussjukdom
Graviditet (tredje trimestern)

För coxiberna (Arcoxia, Dynastat) gäller dessutom att patienten inte ska ha kranskärslsjukdom, perifer kärlsjuka, cerebrovaskulär sjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom och inte amma.

Det finns studier som visar att coxiberna är säkra att ge till de flesta ASA-allergiker.

Vuxna

Arcoxia: Normaldos 120 mg en gång per dygn.

Dynastat: Normaldos 40 mg. Första dygnet kan ytterligare 40 mg ges efter 6 timmar. Vikt < 50 kg halvera dosen!

Toradol: Normaldos 15 mg iv.
Kan initialt ges varannan timme.
Därefter x 4-6.
Max dygnsdos 90 mg. (>65 år eller < 50 kg: 60 mg)

Diklofenak: Initialdos 100 mg. Därefter 50 mg x3.
Max dygnsdos 150 mg.

Pronaxen: Normaldos 500 mg. Två ggr per dygn
Max Dygnsdos 1000 mg.(1250mg Dygn 1)

Blanda inte olika NSAID.

Har man börjat med t ex Pronaxen ska man fortsätta med det.

Byte till annat NSAID endast på läkarordination.

Barn vg se dokumentet [Postoperativ smärtlindring för barn](#)