

ANELÄK Basal övervakning på IVA

När en intensivvårdpatient anländer till IVA sker basal övervakning med nedanstående parametrar. Förbättras patienten kan vissa övervakningsparametrar uteslutas.

Inträder försämring kan tiden mellan avläsningarna minskas och ytterligare parametrar läggas till.

1. Puls

mäts kontinuerligt och noteras 1 gång/timme, utläses från EKG eller saturationsmätare.

2. Blodtryck

avläses vanligen noninvasivt via blodtrycksmanchett. Mäts och noteras minst en gång per timme, oftare om patienten är instabil. Om patienten är svårt sjuk, svårstucken eller vårdtiden antas överstiga ett dygn övervägs blodtrycksmätning invasivt via artärnål.

3. Saturation

mäts kontinuerligt via klämman (finger, tå, öra) och avläses en gång/timme. Anger blodets syresättningsgrad. Gränsvärden ordineras av ansvarig anestesilog. Saturation kan också fås från syra/bas-svar. Om inget annat ordineras; SpO₂>92%

4. Andningsfrekvens

avläses 1 gång/timme, antingen via EKG-modul eller med manuell räkning. Lyssna efter liksidiga andningsljud vid patientövertagande.

5. EKG

mäts kontinuerligt. Visar hjärtats frekvens, rytm, eventuella blockeringar samt tecken på belastning. Frekvensen antecknas enligt puls ovan, övriga EKG-kännetecken minst en gång/8 timmar.

6. Urinmätning

Vare sig patienten kissar spontant eller har KAD mäts urinmängderna och medräknasi vätskebalansen. Produktionen ger vägledning om cirkulation och njurfunktion. Om patienten bedöms som allvarligt sjuk avläses urinproduktionen varje timme sk timdiuresmätning.

Vid oklara förhållanden: använd Bladderscan (ultraljud).

7. Temperatur

Patientens kroppstemperatur mäts minst 4 gånger/dygn.

8. Vätskebalans

räknas ut minst två gånger/dygn, ofta flera.

9. Vikt

tas dagligen för patient i IVA-säng, annars 3 ggr / v (mån, ons, fre)

10. CVP

noteras minst en gång/8 timmar, om patienten har en CVK.

11. VAS (Visuell Analog Skala).

om patienten kan meddela smärta, bör denna bedömas efter "VAS-skala", därefter behandlas och utvärderas med VAS.

12. MAAS (Motor Activity Assessment Scale)

om patienten är sederad så noteras MAAS minst en gång/8 timmar.