

ANELÄK IVA-patienter och inhalationer

Om patienten har en astma eller kronisk bronkit, börja med följande inhalationer och modifiera mängder och volymer efterhand:

Combivent

1 endosbehållare à 2,5 ml innehåller 2,5 mg salbutamol (Ventoline®) och 0,5 mg ipratropiumbromid (Atrovent®)

2,5 ml x 4

Alternativt om man vill separera upp läkemedlen

Ventoline

2 mg/ml 2,5 ml x 4

Atrovent

0,25 mg/ml 2 ml x 4

Om patienterna har mycket segt slem kan man lägga till:

Acetylcystein

200 mg/ml 1 ml x 4

Fyll gärna på med 2-3 ml NaCl vid inhalationerna så att totalvolymen blir 4-5 ml.

Om patienten blir mycket tachycard eller har/får hjärtsvikt, överväg att seponera Ventolinet eller ta en mindre dos.

Blir patienten inte heller märkbart bättre på β -stimulerare (av patientens tidigare egna erfarenhet) uteslut då denna direkt.

Anestesiläkareavdelningen
Ulrika Östberg

Om patienten behöver inhalera adrenalin, oftast barn, ta injektionsvätska 1 mg/ml och späd med NaCl till slutvolym på 2 ml för nebulisering.

Ålder, år	Vikt (kg)	Adrenalin 1 mg/ml, ml	NaCl, ml
<0,5	5	0,25	1,75
0,5-2	10	0,50	1,50
2-5	15	0,75	1,25
5-8	20	1,00	1,00
>8	30	1,50	0,50

Till icke-intuberade barn använd nebulisering via Maxin, se doser och instruktioner i barnvagnen.